



PRP DRACULA THERAPY

Osocze bogatopłytkowe o optymalnym stężeniu, pozyskiwane w sposób naturalny, separowane w rotorach horyzontalnych, bez użycia jakichkolwiek substancji chemicznych czy żeli separujących.

Jak pacjent ma przygotować się do zabiegu osoczem bogatopłytkowym PRP

Skuteczność zabiegu uzależniona jest od jakości krwi pacjenta.

W związku z tym należy:

- Nie spożywać alkoholu na dwie trzy doby przed zabiegiem,
- Nie spożywać tłustych potraw w okresie dwóch dób przed zabiegiem,
- Zwiększyć spożycie wody,
- Nie wprowadzać organizmu w nadmierny wysiłek fizyczny na dwie, trzy doby przed zabiegiem. Nadmierny wysiłek fizyczny wpływa na jakość krwi zmuszając ją do sprostania zwiększonemu zapotrzebowaniu organizmu,
- Unikać nikotyny,
- Zapoznać się z przeciwwskazaniami.

Przeciwwskazania przy wykonywaniu kuracji osoczem bogatopłytkowym

1. Całkowicie zabronione stosowanie PRP:

- choroby, które powodują dysfunkcje płytek krwi,
- nadpłytkowość samoistna,
- niewydolność wątroby, sepsa,
- miejscowa infekcja miejsca, w którym chcemy wykonywać zabieg, gdy pacjent przechodzi terapię przeciwzakrzepową,
- choroby nowotworowe w szczególności rak kości, krwi - białaczka. chemoterapia,
- ciąża, karmienie piersią.

2. Przeciwwskazania, które nie wykluczają stosowania PRP, ale pacjent musi podporządkować się poniższym zaleceniom:

- wyłączyć zażywanie sterydów i leków przeciwzapalnych w okresie 48 godzin przed zabiegiem. Trzeba te leki odstawić na ten okres oraz po zabiegu nie zażywać przez 48 godzin. Należy zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego,
- wyłączyć zażywanie kortykosterydów. Po wykonaniu zabiegów PRP należy odczekać od dwóch tygodni do miesiąca i dopiero wykonywać kurację kortykosterydami,
- pacjent jest w trakcie choroby lub ma gorączkę. Należy przebyć chorobę i odczekać kilka dni,
- HGB < 10 g/dl (hemoglobina); liczba płytek krwi < 105 / ul,
- deficyt glikoprotein, choroba Willebranda, w przypadkach nadprodukcji płytek w chorobie nadpłytkowość samoistna.

Postępowanie po przeprowadzonym zabiegu z użyciem osocza bogatopłytkowego PRP

- W celu maksymalizacji efektów przeprowadzonego zabiegu zalecamy poddanie się zabiegom stabilizująco-odciążającym, przeprowadzanym przez doświadczonego fizjoterapeutę.
- W okresie pozabiegowym mogą wystąpić miejscowe dolegliwości bólowe. Jest to zjawisko normalne i krótkotrwałe.
- W przypadku konieczności zażycia leków przeciwbólowych, chory może stosować paracetamol lub tramadol.
- Bezpośrednio po zabiegu nie zaleca się prowadzenia samochodu.
- Zalecana jest wizyta kontrolna w 7 - 21 dniu po zabiegu – ocena funkcji kończyny, stopień dolegliwości, ew. wdrożenie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej.